

大豆とそばの放射性セシウム吸収抑制対策

福島県農林水産部

1 放射性セシウム吸収抑制対策

平成29年産のモニタリング検査（平成30年3月5日時点）の結果、大豆（288点）、そば（70点）ともに放射性セシウムの基準値（100Bq/kg）を超えたものは皆無でした。また、子実の放射性セシウム濃度は平成24年度から確実に低減しており、これまで福島県営農再開支援事業で進めてきた吸収抑制対策のカリ施用が有効であることが確認されています。

平成30年の大豆、そばの生産に当たっては、これまでの技術対策を継続することを基本とします。

大豆、そばの放射性セシウムの吸収を抑制するためには、生育初期から土壌中の交換性カリ含量を高めておくことが重要なので、以下のとおりカリ施肥を行います。

- ① 土壌分析を行い、吸収抑制に必要なカリ肥料の量を把握します。
- ② カリ施肥は、吸収抑制効果の高い塩化カリ又は硫酸カリを用い目標値を確保した上で県基準の基肥（窒素・リン酸・カリ）を施用することとします。

(1) 土壌分析に基づいたカリ施肥

ア 大豆

(ア) 作付け前の土壌中の交換性カリ含量の目標値は以下のとおりです。

- ① これまでに子実の放射性セシウム濃度が50Bq/kgを超過した地域など放射性セシウム濃度の高い大豆が生産されるおそれのある地域、また、避難指示解除等により、原発事故後、初めて作付けするほ場 : 50mg/乾土100g 以上
- ② 上記以外の地域 : 25mg/乾土100g 以上

(イ) 土壌分析結果から目標値を確保するために必要なカリの量を【表1】から求めます

(ウ) (イ)で求めた量と県基準の基肥を施用します。

(エ) カリ肥料は作土層全体に混和するよう、耕起前に施用してください。

(オ) 基肥は、必ず施用してください。県基準では、窒素 2～3・リン酸 8～12・カリ 8～12 kg/10aです（平成26年度福島県稲作・畑作技術指針、基肥+追肥体系の場合）。

(カ) カリ肥料の施用量が多いと大豆の苦土吸収を阻害する場合がありますので、土壌酸度(pH)を矯正する際には、苦土石灰を施用してください。

【表1】土壌分析に基づくカリの量（大豆の場合）

① 土壌中の交換性カリ含量の目標値50mg/乾土100g 以上 にする場合

作付け前土壌の 交換性カリ含量 (mg/乾土100g)	目標値を確保するために必要なカリの量		
	成分量 (kg/10a)	現物量 (kg/10a)	
		塩化カリ	硫酸カリ
5	6.8	11.4	13.6
10	6.0	10.0	12.0
15	5.3	8.9	10.6
20	4.5	7.5	9.0
25	3.8	6.4	7.6
30	3.0	5.0	6.0
40	1.5	2.5	3.0
50	0	0	0

② 土壌中の交換性カリ含量の目標値25mg/乾土100g 以上 にする場合

作付け前土壌の 交換性カリ含量 (mg/乾土100g)	目標値を確保するために必要なカリの量		
	成分量 (kg/10a)	現物量 (kg/10a)	
		塩化カリ	硫酸カリ
5	3.0	5.0	6.0
10	2.3	3.9	4.6
15	1.5	2.5	3.0
20	0.8	1.4	1.6
25	0	0	0

※ ①、②とも作土層を15cm、土の仮比重を1と仮定した場合の試算値。

イ そば

(ア) 作付け前の土壌中の交換性カリ含量の目標値は以下のとおりです。

- ① これまでに子実の放射性セシウム濃度が50Bq/kgを超過した地域など放射性セシウム濃

度の高いそばが生産されるおそれのある地域、また、避難指示解除等により、原発事故後、初めて作付けするほ場 : 50mg/乾土100g 以上

② 上記以外の地域 : 30mg/乾土100g 以上

(イ) 土壤分析結果から目標値を確保するために必要なカリの量を【表2】から求めます。

(ウ) (イ)で求めた量と県基準の基肥を施用します。

(エ) 基肥は、必ず施用してください。県基準では、窒素 0～3・リン酸 3～5・カリ 2～3 kg/10aです(平成26年度福島県稲作・畑作技術指針)。

【表2】土壤分析に基づくカリの量(そばの場合)

① 土壤中の交換性カリ含量の目標値50mg/乾土100g 以上にする場合

作付け前土壤の 交換性カリ含量 (mg/乾土100g)	目標値を確保するために必要なカリの量		
	成分量 (kg/10a)	現物量 (kg/10a)	
		塩化カリ	硫酸カリ
5	6.8	11.4	13.6
10	6.0	10.0	12.0
15	5.3	8.9	10.6
20	4.5	7.5	9.0
25	3.8	6.4	7.6
30	3.0	5.0	6.0
40	1.5	2.5	3.0
50	0	0	0

② 土壤中の交換性カリ含量の目標値30mg/乾土100g 以上にする場合

作付け前土壤の 交換性カリ含量 (mg/乾土100g)	目標値を確保するために必要なカリの量		
	成分量 (kg/10a)	現物量 (kg/10a)	
		カリ塩化	硫酸カリ
5	3.8	6.4	7.6
10	3.0	5.0	6.0
15	2.3	3.9	4.6
20	1.5	2.5	3.0
25	0.8	1.4	1.6
30	0	0	0

※ ①、②とも作土層を15cm、土の仮比重を1と仮定した場合の試算値。

ウ 次のようなほ場では交換性カリ含量が特に低いと考えられることから、必ず土壤分析を行った上でカリ肥料を施用しましょう。

(ア) 平成30年度に作付を再開するほ場 (イ) たい肥を施用していないほ場

(ウ) 砂質土壤など保肥力の弱いほ場 (エ) 十分な施肥を行ってこなかったほ場

(オ) 新たに大豆又はそばを作付けするほ場

(2) 土壤分析を行うことができない場合のカリ施肥の施用量

地域で最も高い濃度の放射性セシウムを含む子実が生産されたほ場の交換性カリ含量や地域で最も低い交換性カリ含量の値等を踏まえ、【表1】【表2】によりカリ肥料の施用量を決め、県基準の基肥に追加して施肥を行います。

(3) 土作り

ア 作土層の確保

普段から深く耕うんすることを心がけ、作土層の拡大に努めましょう。基肥散布後は、丁寧な耕うんを行うことで肥料を土に十分混和してください。

イ 堆肥の施用

たい肥の投入は、土づくりの基本技術であるとともに、毎年投入することにより交換性カリの安定した補給源となることから、放射性セシウム吸収抑制対策としても極めて重要です。たい肥の窒素含量を考慮し、窒素過剰にならないよう適正な量を投入しましょう。

ウ 福島県営農再開支援事業によるカリ施用をしていない市町村では、通常の土作りによる交換性カリ含量の維持に努めることが重要です。

2 交差汚染の防止

子実への土壤の付着を防ぐための倒伏防止対策を徹底するとともに、コンバイン収穫時の土の巻き込みや異物混入を避けるため丁寧な収穫・乾燥・調製作業を行ってください。

発行：福島県農林水産部農業振興課 TEL 024(521)7344

○農業振興課ホームページ：他の農業技術情報等をご覧ください。

URL：<http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36021a/>

○ふくしま新発売：最新の農林水産物モニタリング情報、イベント情報等をご覧ください。

URL：<http://www.new-fukushima.jp/>