










果樹の生育ステージと防霜対策のための温度指標

平成26年5月8日現在
福島県農林水産部農業振興課

農業総合センター(本部、果樹研究所、会津地域研究所、農業短期大学校)における生育ステージは下記のとおりです。

1 生育ステージ (各ステージに到達した日付を示します。)










(1) もも「あかつき」

発育ステージ	発芽期	花蕾赤色期	花弁露出始期	花弁露出期	開花直前	開花始期	満開期 ~ 開花終期	落花期	幼果期
									
安全限界温度 (°C)	—	-2.6	-2.5	-2.5	-2.5	-2.5	-2.5	—	-2.1
センター本部 (郡山市)	3/28	4/4	4/9	4/12	4/15	4/16	4/22	4/24	4/29
果樹研究所 (福島市)	3/26	4/3	4/7	4/10	4/12	4/14	4/19	4/26	4/29
会津地域研究所 (会津坂下町)	3/29	4/14	4/16	4/21	4/23	4/24	4/27	5/2	5/5
農業短期大学校 (矢吹町)	3/27	4/8	4/10	4/14	4/16	4/17	4/23	4/30	5/4

※1 果樹研究所における「あかつき」の平年値：発芽期 3月26日、開花始期 4月15日、満開期 4月21日。










※2 安全限界温度は、植物体(花芽)の温度がこの指標以下に1時間おかれた場合、わずかでも花芽が障害を受けるおそれがある温度を示します(なし「幸水」以下も同様。)

(2) なし「幸水」

発育ステージ	発芽期	花蕾露出期	花弁露出始期	花弁白色期	開花直前	開花始期	満開期	落花期	幼果期
									
安全限界温度 (°C)	-3.6	-2.9	-2.5	-1.8	-1.8	—	-1.3	—	-1.3
センター本部 (郡山市)	4/4	4/9	4/16	4/21	4/23	4/24	4/27	5/2	
果樹研究所 (福島市)	4/2	4/7	4/10	4/15	4/18	4/21	4/26	5/3	5/7
農業短期大学校 (矢吹町)	4/5	4/9	4/14	4/21	4/23	4/24	4/27	5/7	









※1 果樹研究所における「幸水」の平年値：発芽期 4月3日、開花始期 4月23日、満開期 4月27日。

(3) りんご「ふじ」

発育ステージ	発芽期	展葉初期	花蕾露出期	花蕾着色(赤色)期	開花直前	開花始期	満開期	落花期	幼果期
									
安全限界温度 (°C)	-2.1	-2.1	-2.1	-2.0	—	-1.5	-1.5	-1.7	—
センター本部 (郡山市)	4/2	4/9	4/16	4/25	4/27	4/28	5/1	5/6	
果樹研究所 (福島市)	3/28	4/3	4/14	4/24	4/24	4/25	4/29	5/8	
会津地域研究所 (会津坂下町)	4/3	4/14	4/20	4/28	4/30	5/1	5/6		
農業短期大学校 (矢吹町)	4/1	4/11	4/17	4/25	4/26	4/27	5/1		






※1 果樹研究所における「ふじ」の平年値：発芽期 3月29日、開花始期 4月27日、満開期 5月1日。

(4) おうとう「佐藤錦」

	発芽期	花蕾 露出期	花卉 露出期	開花 ～ 開花 直前 始期		満開期	開花 終期	幼果期
発育ステージ								
安全限界温度 (°C)	-3.0	-1.6	-1.5	-1.7	-1.7	-1.7	-1.1	—
果樹研究所 (福島市)	3/30	4/9	4/13	4/15	4/17	4/23	4/30	5/7

※1 果樹研究所における「佐藤錦」の平年値：発芽期 3月31日、開花始期 4月19日、満開期 4月25日。

(5) ぶどう「巨峰」

	発芽期	一葉期	二葉期	三葉期	四葉期
発育ステージ					
安全限界温度 (°C)	-4.6	-2.0	-2.0	-2.0	-1.8
果樹研究所 (福島市)	4/17	4/25	4/28	5/1	5/3
農業短期大学校 (矢吹町)	4/25	5/1	5/4	5/8	

※1 果樹研究所における「巨峰」の平年値：発芽期 4月19日、展葉期（一葉期）4月25日。

～温度の計測方法について～

- 防霜対策のための温度は、植物体（花芽）の温度で判断します。以下の方法で測定することにより、植物体（花芽）温度に近い測定値が得られます。
- 防霜対策のための温度観測には、輻射よけを付けない裸の棒状温度計を使用し、球部が地上1.5mの位置になるよう設置します。
- デジタル式の温度センサーを用いる場合は、樹脂製の汎用センサー（図1）を用い、センサー部が地上高1.5mに位置するように設置します。
- 棒状温度計や温度センサーは、補正してご利用ください。補正の方法は、下記「関連情報」の「作物別凍霜害等気象災害防止対策」を参照してください。



図1 樹脂製の汎用センサー

2 関連情報

作物別凍霜害等気象災害防止対策

農業振興課ホームページ（トピックスから「作物別凍霜害等気象災害防止対策」をクリック。）

URL : <http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36021a/nogyo-nousin-gijyutu03.html>