

だいで通信 第3号（通算69号）

（令和7年8月発行）

会津若松市・磐梯町・猪苗代町・JA会津よつば（あいづ地区）
福島県農業共済組合会津支所・JA全農福島県本部
福島県会津農林事務所農業振興普及部



国産大豆の需要が高まっています！

東北地方 1 か月予報

＜仙台管区气象台 R7. 7. 31 発表＞

向こう 1 か月の気温、降水量、日照時間の各階級の確率（％）

気温	10	30	60
降水量	20	40	40
日照時間	30	30	40
	低い（少ない）	平年並	高い（多い）

・平均気温は高い確率60%です。

・降水量、日照時間は平年並みまたは多い見込みです。

☑今回の栽培ポイント

- ①高温・乾燥対策 ②病虫害対策

1 高温・乾燥対策

大豆はイネの2倍の水を必要とします！

○大豆の花は多くが落花・落莢します（莢になるのは20～40%ほど）

○開花期～子実肥大期（7月末～9月）にかけて子実を肥大させるため水分が必要となります。

○開花～着莢期の乾燥は莢を少なくする要因となるので、乾燥ストレスを回避するために、灌漑を行いましょう。

灌漑の目安

★どのような場合

○1週間以上降雨がない場合

○50%以上葉が裏返っている場合

★時間帯

○夕方or早朝

（なるべく地温が低いとき）

★どの程度

○ほ場全体の明渠と畝間に水が行き渡ったらすぐ落水




葉が裏返っている様子


2 病害虫防除

紫斑病・害虫の防除を適期に行いましょう

○主な害虫の発生時期と防除時期の目安



すでに葉の食害が多発している場合…
8月下旬を待たずに
殺虫剤を散布しましょう



防除時期の目安



害虫防除 : 1回目 : 8月下旬 2回目 : 9月上旬
紫斑病防除 : 1回目 : 8月中旬 (2回目 : 9月上旬)

薬剤名	適用病害虫	使用方法	使用時期
アミスタートレボンSE	紫斑病、カメムシ類、マメシンクイガ	散布 無人航空機による散布	収穫14日前まで 収穫21日前まで
アミスター20フロアブル	紫斑病	散布 無人航空機による散布	収穫7日前まで
エルサン乳剤	カメムシ類、ツメクサガ、マメシンクイガ	散布	収穫7日前まで
スミチオン乳剤	ウコンノメイガ、カメムシ類、マメシンクイガ	散布 無人航空機による散布	収穫21日前まで

【6/10～9/10 令和7年度農業危害防止運動展開中】

農作業中の熱中症に注意！！

暑い日が続いています。作業前・作業中はこまめな水分補給や休憩をとりましょう。
熱中症警戒アラート等の情報を確認し、日々の体調管理に一段と気をつけましょう。