

令和8年版福島県農作物病害虫防除指針の変更

○令和8年5月に登録内容の変更があった農薬

該当ページ	作物名	農薬名	変更があった箇所	変更前	変更後	変更月日
P151	ネギ	アグロスリン乳剤	対象病害虫「アザミウマ類」 防除時期「生育期間」 防除方法(薬剤の種類、濃度、使用量)	2,000倍	1,000~2,000倍	5月13日
P152			対象病害虫「ネギコガ」 防除方法(薬剤の種類、濃度、使用量)	2,000倍	1,000~2,000倍	
P316	飼料用 トウモロコシ	プレバソンフロアブル5	対象病害虫「アワノメイガ」 防除時期「収穫前日まで」 備考	1 子実利用に限る	削除	5月27日
P332	西洋芝 (ベントグラス)	イカルガ35SC	対象病害虫「葉腐病(ブラウンパッチ)」 防除方法(薬剤の種類、濃度、散布液量)	0.5L/m ²	<u>0.5L/m²</u>	5月13日
			対象病害虫「ダラースポット病」 防除方法(薬剤の種類、濃度、散布液量)	0.2L/m ²	<u>0.2L/m²</u>	
			対象病害虫「フェアリーリング病」 防除方法(薬剤の種類、濃度、散布液量)	1L/m ²	<u>1L/m²</u>	
			対象病害虫「雪腐小粒菌核病」 防除方法(薬剤の種類、濃度、散布液量)	0.5L/m ²	<u>0.5L/m²</u>	
P333	日本芝	イカルガ35SC	対象病害虫「葉腐病(ラージパッチ)」 防除方法(薬剤の種類、濃度、散布液量)	0.3L/m ²	<u>0.3L/m²</u>	5月13日
			対象病害虫「フェアリーリング病」 防除方法(薬剤の種類、濃度、散布液量)	1L/m ²	<u>1L/m²</u>	

○令和8年5月に失効した農薬

失効月日	農薬名	備考	備考欄
		該当ありません。	

注) 最新の農薬登録情報を確認のうえ、農薬を使用すること。
注) メーカーにより使用基準が異なる場合があるため、ラベルに記載されている使用方法等を確認すること。