

令和8年 水稻病虫害発生状況（8月）

1 調査の概要

（1）巡回調査地点・ほ場数… 中通り：13 地点・104 ほ場

会 津： 9 地点・ 72 ほ場

浜通り： 8 地点・ 60 ほ場

（2）すくい取り調査地点数… 中通り：14 地点

会 津：10 地点 ※8 月上旬:9 地点(降雨のため)

浜通り： 9 地点

2 葉いもち

発生ほ場割合は、浜通りで平年よりやや高く、中通りで平年よりやや低くなりました。会津での発生は確認されませんでした（図1）。




図1 葉いもちの発生状況（8月上旬）

3 穂いもち

発生ほ場割合は、会津、浜通りで平年並となりました。中通りでの発生は確認されませんでした（図2）。




図2 穂いもちの発生状況（8月下旬）

4 紋枯病

8月上旬の発生ほ場割合は、会津で平年より高く、浜通りで平年よりやや高く、中通りで平年並となりました（図3）。

8月下旬の発生ほ場割合は、会津で平年よりやや高く、中通りで平年並、浜通りで平年より低くなりました（図4）。




図3 紋枯病の発生状況（8月上旬）




図4 紋枯病の発生状況（8月下旬）

5 稲こうじ病

8月下旬の調査では、中通りで平年並、会津、浜通りでの発生は確認されませんでした（図5）。




図5 稲こうじ病の発生状況（8月下旬）

6 ごま葉枯病

8月下旬の発生ほ場割合は、全域で平年並となりました（図6）。




図6 ごま葉枯病の発生状況（8月下旬）

7 イネツトムシ（イチモンジセセリ）

8月上旬の発生ほ場割合は、浜通りで平年よりやや高く、中通り、会津で平年並となりました（図7）。

8月下旬の発生ほ場割合は、中通りで平年より高く、浜通りで平年よりやや高く、会津で平年よりやや低くなりました（図8）。




図7 イネツトムシの発生状況（8月上旬）




図8 イネツトムシの発生状況（8月下旬）

8 イネアオムシ（フタオビコヤガ）

8月上旬、下旬ともに発生は確認されませんでした。

9 斑点米カメムシ類

8月上旬の調査では、発生ほ場割合は中通り、浜通りで平年並、会津で平年よりやや低くなりました（図9）。

8月下旬の調査では、発生地点割合は中通りで平年並、会津で平年よりやや低くなり、浜通りで平年より低くなりました（図10）。

発生種別では、中通り、会津でカスミカメムシ類、中通りでホソハリカメムシが捕獲されました（図11）。




図9 水田内すくい取り調査による斑点米カメムシ類の発生状況（8月上旬）




図10 水田内すくい取り調査による斑点米カメムシ類の発生状況（8月下旬）




図 11 水田内すくい取り調査による斑点米

カメムシ類の種別発生状況(中通り、8月下旬)




図 12 水田内すくい取り調査による斑点米

カメムシ類の種別発生状況(会津、8月下旬)




図 13 水田内すくい取り調査による斑点米

カメムシ類の種別発生状況(浜通り、8月下旬)




図 14 水田内すくい取り調査による斑点米

カメムシ類の種別発生状況(県全体、8月下旬)

注) アカスジ：アカスジカスミカメ、アカヒゲ：アカヒゲホソミドリカスミカメ、ホソハリ：ホソハリカメムシ
クモヘリ：クモヘリカメムシ、イネカメ：イネカメムシ