

## V 有害大氣污染物質調查結果

この測定結果は、大気汚染防止法第22条第1項の規定に基づき、県内の有害大気汚染物質による大気の汚染状況についてモニタリング調査を行い、同法第24条の規定に基づいてその結果を公表するものです。

## 1 有害大気汚染物質モニタリング調査の概要

### (1) 測定期間

平成25年4月～平成26年3月

### (2) 実施機関

福島県、郡山市及びいわき市

### (3) 測定地点

県内4市において、一般環境6地点、発生源周辺2地点及び道路沿道2地点の計10地点で測定しました。

表1 測定地点一覧

地域分類 (地点数)	市町村	測定地点	所在地	測定機関
一般環境 (6)	福島市	信夫ヶ丘運動場	古川 14-1	福島県
	会津若松市	大気測定局(会津若松局)	西栄町 4-61	
	郡山市	開成山公園	開成 1 丁目	郡山市
	いわき市	大気測定局(揚土局)	平字揚土 5	いわき市
		大気測定局(中央台局)	中央台鹿島 1 丁目 55	
大気測定局(常磐局)	常磐湯本町栄田 11			
発生源周辺 (2)	郡山市	大気測定局(芳賀局)	芳賀 2 丁目 6-1	郡山市
	いわき市	大気測定局(中原局)	小名浜字中原 5-1	いわき市
道路沿道 (2)	福島市	県庁東分庁舎	杉妻町 5-75	福島県
	いわき市	大気測定局(平局)	平字正内町 22	いわき市

### (4) 測定項目

「大気汚染防止法第22条の規定に基づく大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準について(平成25年8月30日付け環境省水・大気環境局長一部改訂)」で測定対象となっている環境基準設定項目等20物質(福島県:12物質、郡山市:10物質、いわき市:17物質)について測定しました。

### (5) 測定方法

「有害大気汚染物質測定方法マニュアル」(平成23年3月環境省)に基づき、各地点毎に月1回連続24時間サンプリングを行い測定しました。

## 2 有害大気汚染物質モニタリング調査の結果

### (1) 環境基準設定項目

#### ア ベンゼン

各測定地点の年平均値は  $0.63 \sim 1.3 \mu\text{g}/\text{m}^3$  であり、すべての測定地点で環境基準 ( $3 \mu\text{g}/\text{m}^3$  以下) を達成しました。(表 2)

#### イ トリクロロエチレン

各測定地点の年平均値は  $0.10 \sim 0.35 \mu\text{g}/\text{m}^3$  であり、すべての測定地点で環境基準 ( $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) を達成しました。(表 2)

#### ウ テトラクロロエチレン

各測定地点の年平均値は  $0.018 \sim 0.17 \mu\text{g}/\text{m}^3$  であり、すべての測定地点で環境基準 ( $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) を達成しました。(表 2)

#### エ ジクロロメタン

各測定地点の年平均値は  $0.69 \sim 1.8 \mu\text{g}/\text{m}^3$  であり、すべての測定地点で環境基準 ( $150 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) を達成しました。(表 2)

### (2) 指針値設定項目

ヒ素及びその化合物について指針値を超過する地点がありました。(表 2)

#### ア アクリロニトリル

各測定地点の年平均値は  $0.019 \sim 0.047 \mu\text{g}/\text{m}^3$  であり、すべての測定地点で指針値 ( $2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) を下回りました。

#### イ 塩化ビニルモノマー

揚土局測定地点の年平均値は  $0.027 \mu\text{g}/\text{m}^3$  であり、指針値 ( $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) を下回りました。

#### ウ クロロホルム

各測定地点の年平均値は  $0.10 \sim 0.12 \mu\text{g}/\text{m}^3$  であり、すべての測定地点で指針値 ( $18 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) を下回りました。

#### エ 1,2-ジクロロエタン

揚土局測定地点の年平均値は  $0.14 \mu\text{g}/\text{m}^3$  であり、指針値 ( $1.6 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) を下回りました。

#### オ 水銀及びその化合物

揚土局測定地点の年平均値は  $5.4\text{ng}/\text{m}^3$  であり、指針値 ( $40\text{ng}/\text{m}^3$ ) を下回りました。

#### カ ニッケル化合物

各測定地点の年平均値は  $1.1 \sim 1.6\text{ng}/\text{m}^3$  であり、すべての測定地点で指針値 ( $25\text{ng}/\text{m}^3$ ) を下回りました。

#### キ ヒ素及びその化合物

各測定地点の年平均値は  $2.3 \sim 20\text{ng}/\text{m}^3$  であり、中原局 ( $20\text{ng}/\text{m}^3$ ) 及び中央台局 ( $19\text{ng}/\text{m}^3$ ) の 2 地点で指針値 ( $6\text{ng}/\text{m}^3$ ) を超過しました。

指針値超過地点については、監視を継続するとともに、超過原因の調査等を引き続き実施します。

ク 1,3-ブタジエン

各測定地点の年平均値は  $0.050 \sim 0.14 \mu\text{g}/\text{m}^3$  であり、すべての測定地点で指針値 ( $2.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) を下回りました。

(3) その他の項目

アセトアルデヒド、塩化メチル、酸化エチレン、トルエン、ベンゾ[a]ピレン、ホルムアルデヒド、ベリリウム及びその化合物、クロム及びその化合物の8物質については、すべての測定地点で平成24年度における全国の状況と同程度の濃度でした。(表2)

表2 平成25年度有害大気汚染物質モニタリング調査結果の概要

物質名 (単位)	地域分類	測定値(年平均値)						全国の状況 <sup>※1</sup>		環境基準 (指針値) ※2
		地点数				平均	測定値の範囲	年平均値	測定値の 最大	
		福 島 県	郡 山 市	い わ き 市	計					
ベンゼン ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	一般環境	2	1	2	5	0.94	0.63 ~ 1.2	1.0	1.8	3
	発生源周辺		1		1	0.67	0.67	1.3	3.0	
	道路沿道	1		1	2	1.2	1.2 ~ 1.3	1.4	2.5	
トリクロロエチレン ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	一般環境	2	1	2	5	0.21	0.10 ~ 0.29	0.44	3.9	200
	発生源周辺		1		1	0.35	0.35	0.67	10	
テトラクロロエチレン ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	一般環境	2	1	2	5	0.072	0.018 ~ 0.17	0.17	1.4	200
	発生源周辺		1		1	0.071	0.071	0.18	0.94	
ジクロロメタン ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	一般環境	2	1	2	5	1.0	0.69 ~ 1.8	1.5	6.8	150
	発生源周辺		1		1	0.79	0.79	2.0	13	
アクリロニトリル ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	一般環境		1	1	2	0.033	0.019 ~ 0.047	0.055	0.43	(2)
	発生源周辺		1		1	0.026	0.026	0.16	1.8	
塩化ビニルモノマー ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	一般環境			1	1	0.027	0.027	0.040	0.88	(10)
クロロホルム ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	一般環境		1	1	2	0.12	0.11 ~ 0.12	0.18	1.9	(18)
	発生源周辺		1		1	0.10	0.10	0.26	1.3	
1,2-ジクロロエタン ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	一般環境			1	1	0.14	0.14	0.15	0.92	(1.6)
水銀及びその化合物 ( $\text{ng}/\text{m}^3$ )	一般環境			1	1	5.4	5.4	2.0	6.1	(40)
ニッケル化合物 ( $\text{ng}/\text{m}^3$ )	一般環境	2		1	3	1.4	1.1 ~ 1.6	3.4	20	(25)
ヒ素及びその化合物 ( $\text{ng}/\text{m}^3$ )	一般環境			3	3	8.4	2.3 ~ 19	1.3	13	(6)
	発生源周辺			1	1	20	20	5.9	24	
1,3-ブタジエン ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	一般環境		1	1	2	0.054	0.050 ~ 0.058	0.10	0.32	(2.5)
	発生源周辺		1		1	0.072	0.072	0.18	2.0	
	道路沿道	1		1	2	0.13	0.12 ~ 0.14	0.18	0.45	

物質名 (単位)	地域分類	測定値(年平均値)						全国の状況 <sup>※1</sup>		環境基準 (指針値) ※2
		地点数				平均	測定値の範囲	年平均値	測定値 の最大	
		福 島 県	郡 山 市	い わ き 市	計					
アセトアルデヒド ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	一般環境	2			2	1.5	0.56 ~ 2.6	1.9	12	—
	道路沿道	1		1	2	1.0	1.2 ~ 1.9	2.2	14	
塩化メチル ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	一般環境	2			2	1.8	1.7 ~ 2.0	1.5	13	—
酸化エチレン ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	一般環境	2			2	0.070	0.079 ~ 0.19	0.080	2.1	—
トルエン ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	一般環境	2	1		3	14	5.9 ~ 20	7.2	180	—
	発生源周辺		1		1	8.5	8.5	8.5	180	
	道路沿道	1		1	2	9.6	5.8 ~ 13	9.2	150	
ベンゾ[a]ピレン ( $\text{ng}/\text{m}^3$ )	一般環境			1	1	0.092	0.092	0.17	4.6	—
	道路沿道	1		1	2	0.094	0.093 ~ 0.095	0.20	2.9	
ホルムアルデヒド ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	一般環境	2			2	1.9	0.75 ~ 3.3	2.3	18	—
	道路沿道	1		1	2	2.0	0.99 ~ 3.5	2.7	28	
ベリリウム及び その化合物( $\text{ng}/\text{m}^3$ )	一般環境		1	1	2	0.014	0.011 ~ 0.016	0.022	0.64	—
	発生源周辺		1		1	0.012	0.012	0.029	0.25	
クロム及び その化合物( $\text{ng}/\text{m}^3$ )	一般環境		1		1	1.6	1.6	4.0	590	—
	発生源周辺		1		1	1.8	1.8	6.7	72	

※1：出典：平成24年度大気汚染状況について（有害大気汚染物質モニタリング調査結果報告）（環境省）

※2：ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタンについては環境基準

アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、水銀及びその化合物、ニッケル化合物、ヒ素及びその化合物、1,3-ブタジエンについては指針値